

WET NURSE™

ALIMENT D'ALLAITEMENT POUR VEAUX [21-8-5]

Numéro d'enregistrement 580036
Cet aliment contient du sélénium ajouté à 0,3 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes (min.)	21,0%
Protéines brutes d'origine laitière (min.)	8,0%
Matières grasses brutes (min.)	5,0%
Fibre brute (max.)	1,0%
Calcium (réel)	0,8%
Phosphore (réel)	0,6%
Sodium (réel)	0,75%
Vitamine A (min.)	50,000 IU/kg
Vitamine D ₃ (min.)	10,000 IU/kg
Vitamine E (min.)	150 IU/kg

INGRÉDIENTS

On peut se procurer la liste des ingrédients en s'adressant au fabricant ou au détenteur d'enregistrement.

REMARQUE: Pour conserver la fraîcheur, bien fermer les sacs partiellement utilisés après ouverture.

MODE D'EMPLOI POUR LE MÉLANGE OU L'ALIMENTATION AU VERSO

Le poids net est indiqué sur le sac
Le numéro de lot est indiqué sur le sac

Fabriqué par



Prairie Micro-Tech Inc.

Siège social (titulaire de l'enregistrement)
PO Box 26028 12-550 Trillium Drive
2641 Albert Street N Kitchener, ON
Regina, SK Canada Canada
S4R 8R7 N2R 1K3

2610A Progressive Way
Abbotsford, BC Canada
V2T 6H9

www.pmtgroup.com

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Poudre de lait de remplacement	Eau potable fraîche	Température de l'eau
150 g	1000 ml	38° - 45° C

DIRECTIONS DE MÉLANGE:

- Pour assurer un mélange adéquat, utilisez une balance pour la pesée de la poudre de lait
- Utilisez toujours de l'eau fraîche potable pour la préparation de la solution de lait de remplacement
- Ajoutez la poudre à l'eau (38°- 45°C) mélangez bien à l'aide d'un fouet métallique
- Préparez seulement le lait nécessaire pour un repas à la fois
- Lavez, rincez et désinfectez correctement les ustensiles après chaque buvée

PLAN D'ALIMENTATION PAR BUVÉE – 2 X PAR JOUR

NOTE : Pour les veaux à large charpente, alimenter trois fois par jour

NOTE : Durant les périodes de froid lorsque la température chute sous les 4°C pour une période prolongée, nous recommandons d'augmenter la consommation quotidienne jusqu'à 50% en ajoutant une troisième buvée journalière de lait de remplacement

Âge (jours)	Lait entier (ml)	Aliment d'alimentation par buvée (ml)	Température de la préparation à la buvée	Solution liquide totale par buvée (ml)
0 – 3*	Colostrum*	Aucun*	Voir note*	Aucun*
4 - 7	1500	500	38°C	2000
8 - 14	1500	1000	38°C	2500
15 - 21	1500	1500	38°C	3000
22 - 28	Aucun	3000	38°C	3000
29 - 35	Aucun	3000	38°C	3000
36 - 42	Aucun	3000	38°C	3000
43 - 49	Aucun	2500	38°C	2500
50 - 56	Aucun	2000	38°C	2000

*NOTES RELATIVES À LA PRISE DU COLOSTRUM:

- Servez de 4 à 6 litres de colostrum de bonne qualité dans les 8 heures suivant la naissance
- Continuez l'alimentation de lait de transition pour un maximum de 3 jours
- S'il y a manque ou insuffisance le lait entier dans les trois premières semaines après la naissance, utiliser uniquement WET NURSE 20-20-20 ou WET NURSE 20-20-16 pour la solution.

PRÉCAUTIONS

- Si les veaux ont moins de trois semaines, on doit utiliser WET NURSE 21-8-5 en combinaison avec du lait entier
- Suivre le mode d'emploi à la lettre
- Les veaux doivent avoir un accès continu à de l'eau propre et de bonne qualité
- À partir d'environ une semaine d'âge, donnez accès à un aliment de démarrage pour veaux de bonne qualité à libre choix
- Suivez les recommandations de votre conseiller en alimentation

Pour plus d'information en regard avec l'utilisation des laits de remplacement Wet Nurse™, consultez le site Web de PMT www.pmtgroup.com

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les résultats individuels, suite de l'utilisation de ce produit, peuvent varier en raison de différences de gestion, d'environnement, d'état de santé et de conditions génétiques et sanitaires. C'est pourquoi Prairie Micro-Tech ne garantit pas les résultats individuels.