

WET NURSE™

ALIMENT D'ALLAITEMENT POUR PORCELETS [24-24-12]

Numéro d'enregistrement 480033
Cet aliment contient du sélénium ajouté à 0,3 mg/kg

ANALYSE GARANTIE

Protéines brutes (min.)	24,0%
Protéines brutes d'origine laitière (min.)	24,0%
Matières grasses brutes (min.)	12,0%
Fibre brute (max.)	0,1%
Calcium (réel)	0,8%
Phosphore (réel)	0,6%
Sodium (réel)	0,7%
Zinc (réel)	100 mg/kg
Cuivre (réel)	10 mg/kg
Vitamine A (min.)	20,000 IU/kg
Vitamine D ₃ (min.)	1,500 IU/kg
Vitamine E (min.)	50 IU/kg

INGRÉDIENTS

On peut se procurer la liste des ingrédients en s'adressant au fabricant ou au détenteur d'enregistrement.

REMARQUE: Pour conserver la fraîcheur, bien fermer les sacs partiellement utilisés après ouverture.

MODE D'EMPLOI POUR LE MÉLANGE OU L'ALIMENTATION AU VERSO

Le poids net est indiqué sur le sac
Le numéro de lot est indiqué sur le sac

Fabriqué par



Prairie Micro-Tech Inc.

Siège social (titulaire de l'enregistrement)

PO Box 26028
2641 Albert Street N
Regina, SK Canada
S4R 8R7

12-550 Trillium Drive
Kitchener, ON
Canada
N2R 1K3

2610A Progressive Way
Abbotsford, BC Canada
V2T 6H9

www.pmtgroup.com

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Poudre de lait de remplacement	Eau potable fraîche	Température de l'eau
180 g	1000 ml	38° - 45° C

NOTES DE MÉLANGE:

- Pour assurer un mélange adéquat, utilisez une balance pour la pesée de la poudre de lait
- Utilisez toujours de l'eau fraîche potable pour la préparation de la solution de lait de remplacement
- Préparez seulement le lait nécessaire pour un repas à la fois
- Ajoutez la poudre à l'eau (38°- 45°C) mélangez bien à l'aide d'un fouet métallique
- Lavez, rincez et désinfectez correctement les ustensiles après chaque buvée

PLAN D'ALIMENTATION

ALIMENTATION MANUELLE PAR BOUTEILLE/AUGE :

Alimenter selon cet horaire:

Age (jours)	Solution de lait de remplacement par buvée (ml)	Température de la préparation à la buvée °C	Nombre de Repas par jour
0 – 3	Colostrum*	Voir Notes*	Aucun
0 - 3 (orphelins)	60	38°C	12
4 - 7	125	38°C	12
8 – 13*	250	38°C	6
14 – 18*	250	38°C	4
19 – 21*	250	38°C	2
22	Sevrage		

Notes *

- Si possible laisser les porcelets avec les truies pour un minimum d'un à 3 jours après la naissance afin d'obtenir les bénéfiques du colostrum.
- Lorsqu'alimenté par bouteille ou par auge, offrir une moulée début fraîche et de haute qualité ainsi que de l'eau à tous les jours à commencer à l'âge de 10 jours.
- Si les porcelets développent une diarrhée suite à une surconsommation, réduire la concentration de la solution de lait de remplacement par 25 à 50% pour 1-2 jours et servir des électrolytes, si nécessaire. Retourner graduellement à un niveau d'alimentation complet.

PRÉCAUTIONS

- Suivre le mode d'emploi à la lettre
- Pour plus d'information concernant l'utilisation des laits de remplacement Wet Nurse™, consultez le site Web de PMT www.pmtgroup.com

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les résultats individuels, suite de l'utilisation de ce produit, peuvent varier en raison de différences de gestion, d'environnement, d'état de santé et de conditions génétiques et sanitaires. C'est pourquoi Prairie Micro-Tech ne garantit pas les résultats individuels.